## PROVA D'ESAME • SESSIONE SUPPLETIVA 2017

## Liceo scientifico e opzione scienze applicate

Trovare una funzione g, il cui insieme di definizione sia un qualsiasi intervallo contenente 0, tale che:

$$g(0) = 0$$
,  $g'(0) = 0$ ,  $g''(0) = 0$ ,  $g'''(0) = 1$ ,  $g^{(4)}(0) = 1$  e  $g^{(5)}(0) = 1$ .

## **SOLUZIONE • SESSIONE SUPPLETIVA 2017**

## Liceo scientifico e opzione scienze applicate

Cerchiamo la funzione g(x) fra le funzioni polinomiali di grado 5 (perché 5 è l'ordine maggiore della derivata non nulla in x = 0):

$$g(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f.$$

Deriviamo la funzione g(x) fino al quinto ordine:

$$g'(x) = 5ax^4 + 4bx^3 + 3cx^2 + 2dx + e$$

$$g''(x) = 20ax^3 + 12bx^2 + 6cx + 2d$$

$$g'''(x) = 60ax^2 + 24bx + 6c,$$

$$g^{(4)}(x) = 120ax + 24b,$$

$$g^{(5)}(x) = 120a,$$

e risolviamo il sistema individuato dalle 6 condizioni fornite:

$$\begin{cases} g(0) = 0, g'(0) = 0, g''(0) = 0 \\ g'''(0) = 1, g^{(4)}(0) = 1, g^{(5)}(0) = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} f = 0, e = 0, 2d = 0 \\ 6c = 1, 24b = 1, 120a = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f = 0, e = 0, d = 0 \\ c = \frac{1}{6}, b = \frac{1}{24}, a = \frac{1}{120} \end{cases}$$

La funzione cercata è dunque:

$$g(x) = \frac{1}{120}x^5 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{6}x^3$$

che è definita su  $\mathbb{R}$  e quindi su ogni intervallo contenente 0.